Malvasia bianca

Vass7R04s311-315

***Collection Vassal-Montpellier**

OMtp666

3615 0Mtp666

Malvasia bianca

Vass7R04s311-315

ntiminalimiton historianimal



ANNEE 1991

MOM Malvasia bianca EMPLACEMENT 7 Rg 4 & 311.315

Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/deb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo debut	raison mi/f	fin	Vé: début	raiscn mi/v	fin	Maturitó
1	1										1	19 °8 +1
→ 4° 10		15,5 15,5) le 18.		•	Couleur Saveur Port &	disc-s E : B-C : s - (: avec	rph-ell r-Rs-I m-lefai g - apy	l-ov-d Rg-N c - fo yrène	bov-cy Jus	vl-fus : inc erb		L - M G

ANNEE 1992

NOM Malvasia bianea EMPLACEMENT 7 Rg 4 s 311. 315

Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-	Flo: début	raison mi/f	fin	Véraison début mi/v fin			Maturité
1 2	f	1/ 1	162		£	22.5	26.5	3015	30.7	4.8	8.8	31,8
3 4 5		16.3	2		Couleur Saveur Pépins Port :	disc- r : B- : s - : ave	sph-@l Gr-Rs- m - a c - ap	Rg-N ar - f yrène	Jus ox - h	; ind	- C(L -M-C

V4

ANNEE 1993												
NOM Halvasia lianca. EMPLACEMENT 7 R43-311.315												
Aust.	Aust. 8.82. mi											
Souche	Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturite										Maturité	
1 %						a day district on the second						
×			· ·	į						the state of the s		
3	2	16,3	183 .	0	Grappe	: G -	M - P	Dim		Compa	cité	: L - M- C
4 8			:		Pour : Baie :		Mil	1/4				
5	2	16.3	19.3 ×	0 ;	Baie:	TC - 9 disc-sp	h-e11	- P [Dim: bov-cyl	L-fus		
		:			Couleur						- col	loré
) Ce	18,3	13		Saveur				ox - he	erb		
		-2			Pépins Port :	/ avec	: - ap		igueur	:		
		- 1										
			-	*								

AMNEE: 1994 NOM Halvasia bianca EMPLACEMENT 7 Ry & 311.315 ni. Souche Nbre Débourrement Hbre yeux début mi/déb grap Ferti-Floraison Véraison début mi/f fin début mi/v fin Maturité Floraison lité 1031 0 2 1 m 7 3 1031 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - N-3 2.3 7.3 × Pour : Mill : 2.3 7.3 × Baie: TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb 1 % 7.3.94 (0) Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

ANNEE: 1995 NOM Halvasia bianca EMPLACEMENT. 7 Rh & 311. 315

ouche	Whre yeux	Débourgement libre début mi/déb grap			Ferti-	Flor		Véraison début mi/v fin			Maturit é			
	yeux	USDA C	161 Hen	du cel							-			
1	2/			0										
2														
3	2			O Crappe: G - M - P Dim: Compacité:										
4	2	à.		0	Pour :		Mil					1		
		7			Baie :	TC -	G - 11	- P	Dim:					
5	2	小多		0		disc-s	ph-ell	-ov-o	hov-cy	l-fus				
					Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré									
					Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène									
1 8					Fort: eng Vigueur: 1									
						0								
					1									

ANNEE: 1996 HOM Malvasia bianca EMPLACIMENT. 7 R4 1 341. 315 m 8-82 Whre Débourrement Dibre yeux début mi/deb grap Véraison Thoraison Fertidebut mi/v fin Waturtte iche debut mi/f | fin lité 28.2. D Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - 1 - C 3 21,2 0 Pour: Mill: Ą gaio: Tel - G - M - P Dim: 28.2. 0 e de la disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus 5 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Dle 28.2. 96 (-17) Saveur : s - m - ar - fox - herb Pópins r avec - apyrène Vigueur : Port :

N° d'ordre :

Alvasia bianca 7R4 A-311-315 A.3

Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoni 182 - moyen 183) - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité Laineuse 279.

blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etales - en gouttiere - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 200 - sans villosité laineuse 281.

Tace supérieure: blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - 2 laséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 200 - antièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Faco inférieure

duveteux 2(8) - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

duveteum 220 - séteum 221 - velouté 222 - aranéeum 223 - duveteum 224 - cotonneum 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - Enuve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plaçes bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 283.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 2375 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 90

aliminaliminalimitaalimitaal

Malvasia bianca 7R4 s-311-3155.3

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - movenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement: mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Cilvo 90

idaatan lantan baataa lantaa d

Malvasia bianca 7R48-311-3154.4 Nº d'ordre :

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 / grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145)- velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -

sans villosité pubescente 272 - sans villosité

laineuse 273. limbe : glabre 150 - séteux 151 velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 7 gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163)- point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167) - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 1/71/- court 172. Glabre 173) - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 1(7) - vert 178 leglus touveul Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo go

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Malvasia bianca 7 R 4 s - 311.3152.3

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite ((dimensions 12x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 76 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré \$1.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 15 x 15). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93) - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 > coloré 106. A ombilic très apparent - pen apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1(1) A saveur neutre 1(12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121) A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 168 peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen (31) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 1β4, A peau fine 1(35) - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse (39 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Caloge

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles) Année 2003 Observateur Code cepage Code clone Emplacement: 7 Russu- 315 Nom cepage Malvasia bianca Sarment oiv 104 section transversale : circulaire 1 - elliptique / - aplatie 5 oiv 102 surface : unie 1 - côtelée ? - striée oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtic 2 - rouge violacé 3 - gus 4 oiv 104 lenticelles absentes () - présentes 9 oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence ? - présence ... oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds absence) - présence () oiv 353 longueur entrenoeuds : très courts (-60mm) & -courts (90mm) & -moyens (120mm) 5 longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9 60 oiv 35 ! diamètre entrenoeuds : très petit (Smm) [petit (8mm) (moyen (11mm) 5 - grand

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 = faible 3 - moyen 5 = élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - ele e 7 - très élevé 9. oiv 553 aptitude à la rhizogenèse - très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - éleve - très élevé 9.

Vassal

Noends aplatis I movens @ - saillants 3

(14mm) 7 - frés grand (=17mm) 9

N° d'ordre :

Désignation: Malvaria bianca

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Emplacement: 7 R4 & 341. 345

```
Angle des nervures
                                                : 1 - 2 - 3
Sexe
                                                : 4 - 5 - (6)
                                                : 7 - (8) - 9
L1/L

      L2/L
      : 10 - 11

      Nombre de lobes
      : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

      Prof. sinus latéral Sup.
      : 17 - 18 - 19 - 20

      Prof. sinus latéral Inf.
      : 21 - 22 - 23 - 24

      Forme sinus pétiolaire
      : 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert
                                                 : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                    : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                                 : 271
                                                : 40 - 41
: 42 - 43 - 44
Dents : forme
Dents (angle)
                                     : (45) - 46 - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> = 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire = 63 - 64 - 65 - 66 - 67
```

Rennes 92